

100

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

на коррекцию косметических дефектов медицинским изделием – гиалуроновым гелем «Ревит»

« » 201 г.

Я, (ФИО) _____

Информирован (а) о методе устранения косметических дефектов инъекционными методами, связанных с введением внутривенно с помощью различных техник гелей, содержащих гиалуроновую кислоту.

Гиалуроновый гель «Ревит» является биodeградирующим. Как естественный метаболит, идентичный гиалуроновой кислоте всех живых организмов, он встраивается в окружающие ткани и с течением времени распадается под воздействием ферментов, оставляя объем ткани прежним.

Показания к использованию Ревит:

1. временная коррекция кожных дефектов;
2. коррекция возрастных изменений кожи;
3. для нормализации функции сальных желез;
4. для улучшения цвета лица;
5. лифтинга кожи зоны имплантации;
6. при обезвоживании кожи после загара, солярия или воздействия пониженных температур.

Противопоказания к использованию биodeградируемых имплантатов:

1. Нестабильный психоэмоциональный статус
2. Герпес активная стадия
3. Иммунодефицитные состояния
4. Воспалительные заболевания кожи на момент осмотра
5. Сепсис и септицемия в анамнезе
6. Заболевания соединительной ткани (дерматомиозит, склеродермия, красная волчанка и др.)
7. Псориаз
8. Гиперчувствительность к любому компоненту изделия
9. Введение материала вблизи гемангиом, ангиодисплазий, при варикозных изменениях вен
10. При нарушении целостности кожных покровов в зоне введения, включая интервал менее одного месяца после глубокого химического пилинга и механической обработки кожи (дермабразия) и лазерного воздействия на кожу
11. Отягощенный аллергологический анамнез
12. Инфекционно - аллергическая бронхиальная астма
13. Сахарный диабет
14. Активная фаза туберкулеза
15. При клинически значимых нарушениях свертываемости крови или у пациентов, получающих антикоагулянты
16. Пациенты, получающие терапию цитостатиками, глюкокортикостероидами
17. Злокачественные новообразования
18. Беременность или кормление грудью
19. Хронические заболевания в стадии декомпенсации
20. Склонность к образованию келоидных рубцов

Побочные эффекты:

1. гематомы в месте введения геля;
2. местные реакции в местах инъекций: отек, боль, зуд, чувство распирания, гиперемия, болезненность в месте введения, проходят самостоятельно через несколько часов после имплантации;
3. аллергические реакции на компоненты геля;
4. нарушение пигментации кожи в местах инъекций (при воздействии после процедуры на место имплантации УФО).

При сохранении любой нежелательной реакции более одной недели необходимо обратиться к врачу для проведения соответствующего лечения.

Длительность косметического эффекта зависит от:

1. Возраста пациента
2. Состояния кожи: влажности, тургора, мимической активности.
3. Полноценности ухода за кожей, вредных привычек, условий жизнедеятельности.
4. Гормонального статуса - при снижении количества эстрогенов, влажность и тургор кожи понижается и период эффективности от процедуры значительно ниже.
5. Психоэмоционального статуса пациента, часто отражает уровень основного обмена, чем он выше, тем короче эффект от процедуры.
6. Массаж, физиопроцедуры, тепловые процедуры, солярий снижают длительность нахождения геля в тканях.

Проведена процедура:

Введен гель _____ в объеме _____

С противопоказаниями, возможными осложнениями ознакомлен(а). Памятка пациента выдана на руки. Претензий к врачу не имею

Пациент _____

Дата _____ Врач _____

Рекомендации пациентам:

1. 1-2 дня после проведения процедуры рекомендуется утром и вечером обрабатывать места вколов хлоргексидином;
2. в течение 2 недель после проведения процедуры рекомендуется перед выходом на улицу использовать любые солнцезащитные средства с SPF не менее 10-25, в зависимости от фототипа кожи;
3. после прохождения процедуры не рекомендуется нанесение макияжа в течение минимум 24-х часов;
4. в течение двух недель после прохождения процедуры следует строго воздерживаться от активных физических нагрузок, употребления алкоголя, посещения сауны, турецкой бани, длительного пребывания на солнце, посещения солярия в течение 2 недель;
5. обработанную область нельзя подвергать нагреванию или переохлаждать до тех пор пока полностью не спадет послеинъекционный отек и гиперемия.
6. в течение первой недели после процедуры пациентам следует избегать надавливания на области, подвергшиеся коррекции.
7. не посещать стоматолога в течение 2 недель после процедуры, во избежание контаминации микрофлорой зон введения геля.