

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ на коррекцию косметических дефектов гиалуроновым гелем

« ____ » _____ 20 ____ г.

Я, (ФИО) _____

Информирован (а) о методе устранения косметических дефектов инъекционными методами, связанными с введением внутримышечно с помощью различных техник гелей, содержащих гиалуроновую кислоту.

Гиалуроновый гель Reneall является биodeградируемым. Как естественный метаболит идентичный гиалуроновой кислоте всех живых организмов, он встраивается в окружающие ткани и с течением времени распадается под воздействием ферментов, оставляя объем ткани прежним.

Показания к использованию Reneall:

1. Временная коррекция кожных дефектов;
2. Временная коррекция возрастных изменений кожи;
3. Для нормализации функции сальных желез;
4. Для улучшения цвета лица;
5. Лифтинга кожи зоны имплантации;
6. При обезвоживании кожи после загара, солярия или воздействия пониженных температур.

Противопоказания к использованию Reneall:

1. Гиперчувствительность к любому компоненту изделия.
2. Во время беременности и кормления грудью.
3. При любых заболеваниях кожи в области введения материала.
4. Введение материала вблизи гемангиом, ангиодисплазий, при варикозных изменениях вен.
5. При воспалительных процессах в коже в области планируемого введения.
6. При нарушении целостности кожных покровов в зоне введения, включая интервал менее одного месяца после глубокого химического пилинга и механической обработки кожи (дермабразия) и лазерного воздействия на кожу.
7. Возраст до 18 лет.
8. Противопоказано использовать материал при отягощенном аллергологическом анамнезе, инфекционно-аллергической бронхиальной астме, диабете, активной фазе туберкулеза, пиодермии.

Побочные эффекты:

1. Гематомы в месте введения геля;
2. Местные реакции в местах инъекций: отек, боль, зуд, чувство распирания, гиперемия, болезненность в месте введения, проходят самостоятельно через несколько часов после имплантации;
3. Аллергические реакции на компоненты геля;
4. Нарушение пигментации кожи в местах инъекций (при воздействии после процедуры на место имплантации УФО).

При сохранении любой нежелательной реакции более одной недели необходимо обратиться к врачу для проведения соответствующего лечения.

Длительность косметического эффекта зависит от:

1. Возраста пациента;
2. Состояния кожи: влажности, тургора, мимической активности;
3. Полноценности ухода за кожей, вредных привычек, условий жизнедеятельности;
4. Гормонального статуса - при снижении количества эстрогенов, влажность и тургор кожи понижается и период эффективности от процедуры значительно ниже;
5. Психосоциального статуса пациента, часто отражает уровень основного обмена, чем он выше, тем короче эффект от процедуры;
6. Массаж, физиопроцедуры, тепловые процедуры, солярий снижают длительность нахождения геля в тканях.
7. Приема лекарственных препаратов: L-тироксин, ферменты, ГКС сокращают длительность эффекта

Я понимаю, что медицина – неточная наука, и даже опытный врач не в состоянии абсолютно точно гарантировать получение желаемого результата. Врач не гарантировал мне этого на 100%. Мне полностью ясно, что нарушение мною врачебных рекомендаций и индивидуальные особенности моего организма могут способствовать развитию местных и общих осложнений или стать их причиной. Это, в свою очередь, может ухудшить результаты коррекции и потребовать дополнительного лечения. Если это произойдет по моей вине, я несу за это полную ответственность, в том числе и материальную.

С противопоказаниями, возможными осложнениями ознакомлен(а). Памятка пациента выдана на руки. Претензий к врачу не имею.

Пациент _____

Проведена процедура:

Введен гиалуроновый гель _____ в объеме _____

Дата _____ Врач _____

Рекомендации пациентам:

1. 1-2 дня после проведения процедуры рекомендуется утром и вечером обрабатывать места введения геля хлоргексидином
2. В течение 2 недель после проведения процедуры рекомендуется перед выходом на улицу использовать любые солнцезащитные средства с SPF не менее 10-25, в зависимости от фототипа кожи
3. После прохождения процедуры не рекомендуется нанесение макияжа в течение минимум 24-х часов
4. В течение двух недель после прохождения процедуры следует строго воздерживаться от активных физических нагрузок, употребления алкоголя, посещения сауны, турецкой бани, длительного пребывания на солнце, посещения солярия
5. Обработанную область нельзя подвергать нагреванию или переохлаждению до тех пор пока полностью не спадет послеинъекционный отек и гиперемия
6. В течение первой недели после процедуры пациентам следует избегать надавливания на области, подвергшиеся коррекции
7. Не посещать стоматолога в течение 2 недель после процедуры, во избежание контаминации микрофлорой зон введения геля.